

# SOLUÇÃO DA SEGUNDA LISTA DE TREINAMENTO NÍVEL III

# OMOC

**Questão 1:**

Os quadradinhos do tabuleiro da figura devem ser preenchidos de modo que:

- Nos quadradinhos de cada uma das regiões em forma de apareçam os números 1, 3, 5 e 7 ou os números 2, 4, 6 e 8;
- Em quadradinhos com um lado comum não apareçam números consecutivos.

1			4
3			
4			3

Qual é a soma dos números que vão aparecer nos quadradinhos cinzas?

- a) 12                      b) 14                      c) 16                      d) 18                      e) 20

**Solução:**

## ALTERNATIVA E

Uma maneira de preencher a tabela de acordo com as condições do enunciado é dada abaixo. Em cada etapa, indicamos com a cor cinza as novas casas preenchidas. Notamos que a tabela final é única, independentemente do modo com que ela é preenchida.

1			4
3			
7			
4			3

1	8		4
3	5		
7			
4			3

1	8	6	4
3	5	2	
7			
4			3

1	8	6	4
3	5	2	7
7		5	1
4			3

1	8	6	4
3	5	2	7
7	2	5	1
4	6	8	3

Logo, vemos que a soma dos números nos quadradinhos cinzas marcados no desenho desse enunciado é igual a  $6 + 8 + 5 + 1 = 20$ .

**Questão 2:**

Três amigas possuem, cada uma, três blusas: uma amarela, uma branca e uma preta. Se cada amiga escolher ao acaso uma de suas blusas, qual é a probabilidade de que as cores das blusas escolhidas sejam todas diferentes?

- a)  $\frac{1}{9}$                       b)  $\frac{1}{8}$                       c)  $\frac{2}{9}$                       d)  $\frac{3}{8}$                       e)  $\frac{3}{4}$

**Solução:**

## ALTERNATIVA C

As amigas podem escolher suas blusas, sem restrição, de  $3 \times 3 \times 3 = 27$  maneiras diferentes. Por outro lado, se elas devem escolher blusas sem repetição de cores e uma delas já escolheu a sua entre as 3 possibilidades, uma outra terá apenas 2 possibilidades e a última apenas 1, num total de  $3 \times 2 \times 1 = 6$  possibilidades sem repetição de cores. Logo a probabilidade em questão é igual a  $\frac{6}{27} = \frac{2}{9}$ .

**Questão 3:**

Alberto, Bernardo e Carlos disputaram uma corrida, na qual cada um deles correu com velocidade constante durante todo o percurso. Quando Alberto cruzou a linha de chegada, Bernardo e Carlos estavam 36 e 46 metros atrás dele, respectivamente. Quando Bernardo cruzou a linha de chegada, Carlos estava 16 metros atrás dele. Qual é o comprimento da pista?

- a) 96m                      b) 100m                      c) 120m                      d) 136m                      e) 144m

**Solução:**

## ALTERNATIVA A

Seja  $x$  o comprimento em metros da pista. A distância entre Bernardo e Carlos era de 10 metros quando Alberto cruzou a linha de chegada, e era de 16 metros quando Bernardo cruzou a linha de chegada. Vemos assim que, durante o intervalo de tempo no qual Alberto e Bernardo completaram a corrida, Bernardo correu 36 metros enquanto Carlos correu 30; logo

$$\frac{\text{velocidade de Carlos}}{\text{velocidade de Bernardo}} = \frac{30}{36} = \frac{5}{6}.$$

Como Bernardo cruzou a linha de chegada 16 metros à frente de Carlos, temos a equação  $\frac{5}{6} =$

$\frac{x-16}{x}$ , cuja solução é  $x = 96$ .

**Questão 4:**

Em um quadro, representado na figura abaixo, Elisa brinca de escrever os algarismos de 0 até 9 em uma linha, na ordem que ela escolher. Na linha debaixo ela junta os vizinhos, formando nove números novos, e soma esses números como no exemplo:

2		1		3		7		4		9		5		8		0		6
	21		13		37		74		49		95		58		80		06	
$21 + 13 + 37 + 74 + 95 + 58 + 80 + 6 = 433$																		

Qual é a maior soma que é possível obter desse modo?

- a) 506                      b) 494                      c) 469                      d) 447                      e) 432

**Solução:**


ALTERNATIVA B

Para qualquer disposição dos algarismos, a soma dos vizinhos “juntados” terá sempre nove parcelas, sem repetição de algarismos nas unidades ou nas dezenas. O único algarismo que não aparece nas unidades é o primeiro e o único que não aparece nas dezenas é o último. Para que a soma seja máxima, o algarismo 0 não deve comparecer nas dezenas e, portanto, deve ser o último; além disso, o menor dos algarismos 1, 2, ..., 9 não deve aparecer nas unidades e, portanto, o 1 deve ser o primeiro.

Concluimos que a soma é máxima para qualquer escolha onde 1 é o primeiro algarismo e 0 o último. Nesse caso, a soma das unidades será  $0 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 = 44$  e a soma das dezenas será  $10 + 20 + 30 + 40 + 50 + 60 + 70 + 80 + 90 = 450$ ; a soma máxima é então  $450 + 44 = 494$ .

**Questão 5:**

Estefânia tem cinco cartas marcadas com as letras A, B, C, D e E, empilhadas nessa ordem de cima para baixo. Ela embaralha as cartas pegando as duas de cima e colocando-as, com a ordem trocada, embaixo da pilha. A figura mostra o que acontece nas duas primeiras vezes em que ela embaralha as cartas.



Se Estefânia embaralhar as cartas 74 vezes, qual carta estará no topo da pilha?

- a) A                      b) B                      c) C                      d) D                      e) E

**Solução:**

ALTERNATIVA E

O leitor pode verificar que, se Estefânia embaralhar as cartas 6 vezes, elas voltarão à posição inicial. Como  $74 = 12 \times 6 + 2$ , embaralhar as cartas 74 vezes tem o mesmo efeito que fazê-lo duas vezes, o que deixa a carta E no topo da pilha

**Questão 6:**

O número  $abcde$  tem cinco algarismos distintos e diferentes de zero, cada um deles representado por uma das letras  $a, b, c, d, e$ . Multiplicando-se este número por 4 obtém-se um número de cinco algarismos  $edcba$ . Qual o valor de  $a + b + c + d + e$ ?

- a) 22                      b) 23                      c) 24                      d) 25                      e) 27

**Solução:**

## ALTERNATIVA E

A multiplicação pode ser esquematizada como

$$\begin{array}{r} a \ b \ c \ d \ e \\ \times \qquad \qquad \qquad 4 \\ \hline e \ d \ c \ b \ a \end{array}$$

A solução é baseada nas seguintes observações:

- O algarismo  $a$  só pode ser 1 ou 2, pois, se fosse  $a \geq 3$ , então  $4a$  seria um número de 2 algarismos e, portanto, o número  $edcba$  teria 6 algarismos. Mas  $a$  não pode ser 1 pois  $edcba$ , sendo múltiplo de 4, é par, donde seu último algarismo é par. Logo  $a = 2$ .

$$\begin{array}{r} 2 \ b \ c \ d \ e \\ \times \qquad \qquad \qquad 4 \\ \hline e \ d \ c \ b \ 2 \end{array}$$

- O algarismo  $b$  só pode ser 1 ou 2, pois  $4 \times b$  tem que ser um número de apenas 1 algarismo. Como  $a = 2$  e os cinco algarismos de  $abcde$  são distintos, só podemos ter  $b = 1$ .

$$\begin{array}{r} 2 \ b \ c \ d \ 8 \\ \times \qquad \qquad \qquad 4 \\ \hline 8 \ d \ c \ b \ 2 \end{array}$$

- O algarismo  $d$  só pode ser 2 ou 7, pois  $4 \times d + 3$  é um número terminado em 1. Como  $a = 2$  e os cinco algarismos de  $abcde$  são distintos só podemos ter  $d = 7$ .

$$\begin{array}{r} 2 \ 1 \ c \ 7 \ 8 \\ \times \qquad \qquad \qquad 4 \\ \hline 8 \ 7 \ c \ 1 \ 2 \end{array}$$

- O algarismo  $c$  só pode ser 9, pois  $4c + 3$  é um número terminado em  $c$ .


$$\begin{array}{r} 21978 \\ \times \quad 4 \\ \hline 87912 \end{array}$$

Logo, a resposta é  $8 + 7 + 9 + 1 + 2 = 27$ .

### Questão 7:

Na figura, os dois semicírculos são tangentes e o lado do quadrado mede 36 cm. Qual é o raio do semicírculo menor?

- a) 8 cm
- b) 9 cm
- c) 10 cm
- d) 11 cm
- e) 12 cm



### Solução:

ALTERNATIVA E

Sejam  $R$  e  $r$  os raios dos semicírculos maior e menor, respectivamente; o lado do quadrado tem então medida  $2R = 36$ , ou seja,  $R = 18$ . Como os centros dos semicírculos e o ponto de tangência estão alinhados, o triângulo destacado na figura é um triângulo retângulo de catetos  $R$  e  $2R - r$  e hipotenusa  $R + r$ . O teorema de Pitágoras nos dá  $(R + r)^2 = R^2 + (2R - r)^2$ . Simplificando, obtemos  $6Rr = 4R^2$  segue que  $r = \frac{2}{3}R = \frac{2}{3} \times 18 = 12 \text{ cm}$ .

### Questão 8:

Para chegar à universidade, um estudante utiliza um metrô e, depois, tem duas opções:

- Seguir num ônibus, percorrendo 2,0 km;
- Alugar uma bicicleta, ao lado da estação do metrô, seguindo 3,0 km pela ciclovia.

O quadro fornece as velocidades médias do ônibus e da bicicleta, em km/h, no trajeto metrô-universidade.

Dia da semana	Velocidade média (km/hr)	
	Ônibus	Bicicleta
Segunda-Feira	9	15
terça-feira	20	22
quarta-feira	15	24
quinta-feira	12	15
sexta-feira	10	18
sábado	30	16

A fim de poupar tempo no deslocamento para a universidade, em quais dias o aluno deve seguir pela ciclovia?

- Às segundas, quintas e sextas-feiras.
- Às terças e quintas-feiras e aos sábados.
- Às segundas, quartas e sextas-feiras.
- Às terças, quartas e sextas-feiras.
- Às terças e quartas-feiras e aos sábados

**Solução:**

ALTERNATIVA C

A questão diz que de ônibus é percorrido 2,0 km e de bicicleta é percorrido 3,0 km.


Vamos agora analisar o tempo que o aluno levaria de ônibus e de bicicleta em cada dia da semana. Para isso, vamos dividir a velocidade média por tempo que é percorrido de ônibus (2km) e de bicicleta (3 km).

Dia da semana	Tempo de ônibus	Tempo de bicicleta
Segunda-Feira	$2 \div 9 = 0,22$	$3 \div 15 = 0,2$
terça-feira	$2 \div 20 = 0,1$	$3 \div 22 = 0,13$
quarta-feira	$2 \div 15 = 0,13$	$3 \div 24 = 0,12$
quinta-feira	$2 \div 12 = 0,16$	$3 \div 15 = 0,2$
sexta-feira	$2 \div 10 = 0,2$	$3 \div 18 = 0,16$
sábado	$2 \div 30 = 0,06$	$3 \div 16 = 0,18$

Podemos ver que os únicos dias em que o tempo de bicicleta é menor do que o de ônibus é na segunda, quarta e sexta. São esses os dias em que o aluno deve seguir pela ciclovia.

**Questão 9:**

Uma folha de papel é retangular, com base igual a 20 cm e altura 10 cm. Esta folha é dobrada nas linhas pontilhadas conforme a figura abaixo, e no final recortada por uma tesoura na linha indicada, a qual é paralela à base e está na metade da altura do triângulo.




Depois de cortar no local indicado, qual a área da maior parte?

- $86 \text{ cm}^2$
- $94 \text{ cm}^2$
- $112 \text{ cm}^2$
- $150 \text{ cm}^2$
- $175 \text{ cm}^2$

**Solução:**

## ALTERNATIVA D

Vamos marcar a linha cortada pela tesoura em cinza, e fazer o processo inverso, que corresponde a abrir a folha depois de cortada:



Como se pode observar, os dois quadrados recortados nos cantos superior esquerdo e inferior direito têm lado igual a 5 cm. Como a área de um quadrado é o lado ao quadrado, a área de cada quadrado é igual  $5 \times 5 = 25 \text{ cm}^2$ . A folha é um retângulo de base 20 cm e altura 10 cm. Logo, como a área de um retângulo é base vezes altura, a área da folha é de  $20 \times 10 = 200 \text{ cm}^2$ . Subtraindo a área total pela área dos dois quadrados nos cantos, concluímos que a área do pedaço maior da folha após o corte pela tesoura é

$$200 - 2 \times 25 = 200 - 50 = 150 \text{ cm}^2.$$

**Questão 10:** Com os algarismos 1, 4, 6 e 8 pode-se formar vários números de três algarismos distintos. Qual é a soma de todos esses números?

- a) 12654      b) 12740      c) 13124      d) 13210      e) 13320

**Solução:**

## ALTERNATIVA A

Com os números 1, 4, 6 e 8 podem-se formar  $4 \times 3 \times 2 = 24$  números de três algarismos distintos, pois temos 4 possibilidades para escolher a centena, depois 3 possibilidades para escolher a dezena e por fim 2 possibilidades para escolher a unidade. Nas unidades desses números irão aparecer seis vezes cada um dos algarismos 6, 4, 2 e 1, pois cada um deles aparece o mesmo número de vezes entre os 24 números e  $24 \div 4 = 6$ ; o mesmo irá ocorrer nas dezenas e nas centenas. Como  $6 \times (8 + 6 + 4 + 1) = 114$ , a soma desses 24 números será  $114 + 10 \times 114 + 100 \times 114 = 111 \times 114 = 12654$ .



